

ガストール細粒

第2類医薬品

胃腸薬 M₁プロロッカー配合

- 胃酸は食物の消化に必要なものですが、ストレスや飲み過ぎなどにより必要以上に分泌されると、胃粘膜を攻撃し、胃痛・胸やけ・むかつき・胃もたれなどのつらい胃の症状を引き起こします。
- ガストール細粒は、M₁プロロッカーと制酸剤を配合。制酸剤が出過ぎてしまった胃酸を中和、そして、M₁プロロッカーが過剰な胃酸分泌を抑制することで、つらい胃の症状に優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 授乳中の人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
- ④ 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ(むかつぎ、胃のむかつぎ、二日酔・悪酔のむかつぎ、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ
- 食べ過ぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振

用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1包	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。

成分と作用

3包(1日量)中

成分	3包中	作用
ビレンゼピン塩酸塩水和物 <M ₁ ブロッカー>	47.1mg (ビレンゼピン塩酸塩 無水物として45mg)	出過ぎる胃酸の分泌を抑えます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	900mg	胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。
炭酸水素ナトリウム	1,200mg	胃酸をすみやかに中和します。
ピオチアスターゼ2000	30mg	食物の消化を促します。

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、*l*-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>