

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

ハイチオールCプラス2

第3類医薬品

L-システイン製剤 代謝を助けるアミノ酸“L-システイン”配合

L-システインとは・・・

タンパク質を構成するアミノ酸の1つです。皮膚や肝臓に多く存在し、さまざまな代謝に関与することで、体の健康に大切な働きをしています。

- 肌の代謝（ターンオーバー）を助け、シミ・そばかすを治します。

ハイチオールCプラス2は

- 肌の代謝を助け、過剰にできたメラニンをスムーズに排出
- シミの原因となる過剰な黒色メラニンの生成を抑制
- 肌に沈着してしまった黒色メラニンを無色化することで、シミ・そばかすを治します。

- 体の代謝（エネルギー産生）を助け、疲れ・だるさ（全身倦怠）を改善します。体の代謝が滞ると、エネルギーが効率よく産生できず、疲れやだるさを感じるようになります。

ハイチオールCプラス2は、栄養素をエネルギーに変換する酵素の働きを助け、体内エネルギーの産生をスムーズにすることで疲れやだるさを取り除きます。

- 二日酔いの原因物質の分解を助け、症状を改善します。

二日酔いの原因は、アルコールを代謝する過程で生成されるアセトアルデヒドという物質です。ハイチオールCプラス2は、アセトアルデヒドの分解を助け、二日酔いの症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛



- ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- ③しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

用法・用量

次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成 人 (15才以上)	7才～14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

6錠(成人1日量)中

L-システイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・240mg
 アスコルピン酸(ビタミンC)・・・・・・・・・・500mg
 パントテン酸カルシウム・・・・・・・・・・24mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメ
 ロース、マクロゴール、D-マンニトール、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケ
 イ素、ステアリン酸Ca、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、
 ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンのカバーをよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

**お問い合わせ先**

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
 受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社
 〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>