

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

新エスタックW

第2類医薬品

かぜ薬 1日2回の持続性

- 新エスタック(W)は、効果が長く続くように工夫された持続性のかぜ薬ですから、1日2回(朝・夕食後)の服用ですぐれた効果をあらわします。
- 新エスタック(W)は、かぜの諸症状より強く、熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげ、せきを止め、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状をおさえます。

使用上の注意

- ⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
- 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 - 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、食物アレルギー薬、アレルギー用薬、催眠鎮痛薬等)
 - 服用後、薬物又は機械種の運転操作をしないでください
 - (眼薬等があらわれることがあります。)
 - 服用前後は飲酒しないでください
 - 長期服用しないでください
- ⓧ 相談すること**
- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師又は歯科医師の診療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難。
 - (6)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、悪寒、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死剥離症、急性汎発性発赤性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発赤・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。全身がだるい。発熱がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

(裏面につづく)

⑧: 登録商標

(表面のつづき)

症状の名称	症状
腎障害	発熱、腰痛、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(関節が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりと息切れがする。息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和


用法・用量

次の1回量を1日2回、朝・夕食後に、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	7才~14才	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	×服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方



(PTPシートの取り出し方)

成分 4カプセル(成人1日量)中

アセトアミノフェン	480mg	ノスカピン塩酸塩水和物	20mg
サリチルアミド	400mg	カフェイン水和物	100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	アスコルビン酸(ビタミンC)	100mg

添加物: 二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マル糖、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、シリコーン樹脂、タルク、トウモロコシデンプン、パレインデンプン、ラウリル硫酸Na、エトド酸Ca/2Na、赤色3号、黄色5号、青色1号、黄色2号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります。)
- (4)他の容器を開封後は、品質保持の点から開封日より3か月以内に服用してください。なおPTPシート裏面のアルミ箔が破れたり、開封したまま置いておくと、湿気の影響により変色することがあります。変色したものは服用しないでください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
 受付時間: 9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

エスエス製薬株式会社
 〒182-8581 東京都武蔵野市日野 4-12-4
<http://www.ssd.co.jp/>

⑤

MEMO