

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

特納用

第2類医薬品

胃のもたれ・不快感に のんで爽やか

# 第一三共胃腸薬〔錠剤〕

## 第一三共胃腸薬〔錠剤〕の特徴

次のようなはたらきをもった薬剤で、胃のもたれ・不快感などにお使いいただけます。

- 脂肪消化酵素リパーゼAP12と消化酵素タカジアスターゼN1が、消化を助けます。
- 6種の健胃生薬が弱った胃のはたらきを高め、胃の不快感・食欲不振などに効きめをあらわします。
- 生薬アカメガシワ、カンゾウ末が胃粘膜のあれ・ただれを修復します。
- 塩分のもととなるナトリウムを含んでいません。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。  
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期連用しないで下さい。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人  
排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人  
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## ■ 効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐



もたれに



胃部不快感に



胃痛に

## ■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回 食後に服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないで下さい。	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 11歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分・分量

本剤は、淡灰褐色～淡褐色の素錠で、特異なおいと味があります。  
9錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
タカヂアスターゼN1	150mg	広いpH域ではたらき消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします。
リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で、消化作用をあらわします。
アカメガシワエキス	63mg (アカメガシワとして504mg)	胃腸の過度の緊張をおさえて、胃粘膜を保護し、胃の炎症をしずめます。
カンゾウ末	150mg	
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	720mg	持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護するはたらきもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかねそなえています。
合成ヒドロタルサイト	300mg	
水酸化マグネシウム	600mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
ロートエキス	30mg	胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめます。
オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます。
ケイヒ末	225mg	
ウイキョウ末	60mg	
チョウジ末	30mg	
ショウキョウ末	75mg	
l-メントール	9mg	

添加物：サンショウ、バレイシヨデンポン、CMC、ステアリン酸Mg

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 03 (5205) 8331  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

Y03