

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

お湯に溶かして服用
体力中等度以上の方の ひきはじめのかぜ・肩こりに

第2類医薬品
漢方製剤

カッコン湯エキス顆粒S

特納用

カッコン湯エキス顆粒Sの特徴

1. 漢方処方「葛根湯」のエキス製剤で、味・香りがよく、お湯に溶かして服用できます。
2. かぜにかかり、ぞくぞくする寒気がし、首筋や肩がこわばって、汗がでないような症状に効果があります。
3. 鼻かぜや頭痛に効果があります。
4. 肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みをやわらげます。

【カッコン湯エキス顆粒Sはこんな時に】



! 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症

感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回 食前又は食間にお湯に溶かして服用して下さい。または、そのまま水かお湯で服用して下さい。
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
4歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 4歳以上の幼児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、淡褐色~褐色の顆粒で、3包(1包3.0g)中に次の成分を含有しています。
葛根湯エキス(7/10量).....3.00g

カッコン.....2.82g	ケイヒ.....1.41g
マオウ.....2.12g	シャクヤク.....1.41g
ショウキョウ.....0.71g	カンゾウ.....1.41g
タイソウ.....2.12g	

より製した水製乾燥エキス


添加物：D-マンニトール、白糖、乳糖、ショ糖脂肪酸エステル

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)