



患部に貼るだけ

口内炎・舌炎治療薬

口内炎パッチ大正A

第3類医薬品

◆口内炎パッチ大正Aは、“貼る”口内炎・舌炎治療薬です。口腔内ですぐれた付着力をもち、患部を刺激からしっかりカバーし、また、成分が持続的に作用します。



使用上の注意



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 症状が慢性的な人。
(4) 患部が広範囲(患部を本剤でおおいきれない)の人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

口内炎、舌炎

用法・用量

1患部に1回1枚、1日1～4回、患部粘膜に付着させて用いてください。

*本剤は、5才未満の乳幼児には使用させないでください。

【注意】


- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は溶けません。時間がたつと自然にはがれます。(無理にはがさないでください)
- (3) 本剤は口腔内粘膜貼付剤ですから、内服しないでください。
- (4) 5才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 小児への使用においては、貼付後、指ではがしとるおそれがありますので、注意してください。
- (6) 使用方法をまちがえると付着しないことがありますから、使用方法をよく読んで正しくお使いください。
- (7) はがれたものは飲みこまずに捨ててください。

【パッチの貼り方】

パッチの表裏に注意してください。

- ①うがいなどで患部を清潔にした後、患部の水分・唾液などを軽くふき取ってください。
- ②シートからパッチをはがします。表側の濃い赤色の面が、患部につける薬剤面です。(パッチの表裏に注意してください)
- ③パッチの裏側の淡い桃色の面を指先にとります。(この際、指先を少し湿らせておくと、扱いやすくなります)
- ④濃い赤色の薬剤面が患部に接するように貼ってください。
- ⑤指で数秒間おさえた後、そっと指を離してください。

●患部が唾液等でぬれていると、つきにくいことがあります。



成分

1枚(1パッチ)中

成分	分量	はたらき
シコンエキス	0.10mg (シコンとして4.55mg)	患部の炎症を改善します。
グリチルレチン酸	0.15mg	

添加物：ポリアクリル酸、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース、エチルセルロース、ヒマシ油、酸化チタン

※本剤の主な素材はセルロース類(繊維成分)なので、万一誤って本剤を飲み込んでしまっても消化されず体外に排出されます。また、赤色は有効成分シコンエキスの色です。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折りまげて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)