

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

こり・鎮痛温感貼付薬

てん うん こう  
**点温膏<sup>®</sup>K**

## 特 徴

- 「痛み」ほど苦痛なことはありません。痛みにはいろいろあって、全身をめぐる神経が炎症を起こしたり、打ち身やはれなどの刺激によって急に痛みを感じたり、過激な運動のあとに感じる局所的な痛みなどがあります。
- 最近では肩こり・腰痛などのように痛みが固定化、長期化した場合には温熱刺激作用により温めて、こりや痛みをやわらげる方法が考えられるようになりました。
- 点温膏Kは、温感刺激のあるノニル酸ワニリルアミドや、血液の循環をよくするトコフェロール酢酸エステルなどを配合した小型の貼り薬で、肩こり、腰痛、関節痛などに効果があります。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 用法・用量


1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはる。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(裏面につづきます)

- (5)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそ  
うな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の  
弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として  
半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ  
等の症状が起きないことを確かめてから使用  
してください。
- (7)貼ったままあるいははがした直後に入浴する  
と強い刺激を感じるため、1時間以上前には  
がして入浴してください。また、入浴後は  
30分位してから使用してください。



## 成 分 1.0m<sup>2</sup>(膏体142.375g)中

dl-カンフル	1.8g
l-メントール	4.5g
ハッカ油	1.125g
サリチル酸メチル	9.0g
グリチルレチン酸	0.21g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.5g
ノニル酸ワニリルアミド	0.075g



添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステル  
ガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリ  
ル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニ  
ルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、  
三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄を含有する。

### 貼り方のポイント

- 下図を参考にして貼る場所をきめて、患部を乾いたタオルなどで  
よくふいてから貼ってください。
- 痛いところ、または押すと特に痛みを感じる圧痛点を中心に貼ります。
- 効果があまり見られない時は圧痛点の反対側の同一部位にも貼っ  
てください。

— 肩 こ り —

— 腰 痛 —



### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤  
用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してくだ  
さい。
- (5)使用期限のすぎた商品は使用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店  
又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

**クラシエ 薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**  
富山県富山市水橋島等173 (〒939-3521)