

第2類医薬品

胃腸薬 **キャベジン** ジョウワ錠

私たちの食生活は年々よくなってきており、平均寿命も延びています。ところが、その反面、おいしいものが何でも食べられるために、食べ過ぎたり、お酒を飲みすぎたりして、胃や腸などの消化器系諸臓器に負担がかかり、年齢と共に弱ってくるこれら諸臓器の寿命に悪い影響を与えているケースが増えてきているのです。キャベジンジョウワ錠は、このような胃や腸などの諸臓器を元気に修復し、正常に整えるためのお薬で、粘膜のすぐれた修復成分であるMMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロリド)を1日量として150mg配合してあります。

おのみになっていますと、弱ってきた胃や腸などの諸臓器は、次第に正常な状態に整えられてまいります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胃痛、胃重、胃部不快感、飲みすぎ、食べ過ぎ、嘔吐、胸つかえ、消化不良、消化促進、胃部・腹部膨満感、食欲不振、もたれ、胃弱、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）

用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量（6錠中）

●メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg ●合成ヒドロタルサイト 360.0mg ●炭酸水素ナトリウム 1500.0mg ●メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 540.0mg ●ロートエキス3倍散 90.0mg（ロートエキスとして30.0mg）●ホップ乾燥エキス 30.0mg（ホップとして428.6mg）●センプリ末 28.0mg ●ビオチンアスターゼ2000 30.0mg

[添加物]カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、セラック、タルク、セルロース、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ケイヒ、*l*-メントール、トウモロコシデンプン、デキストリン

<成分・分量に関連する注意>

メチルメチオニンスルホニウムクロリドなどが配合されていますので、特有のニオイがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)水分が錠剤につくと、特有のニオイが強くなったり内容成分の変化のもととなりますので、水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (6)ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (7)使用期限（外箱及びラベルに記載）をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00

