

## 用法（添付文書記載内容）

[年齢：1回量：1日服用回数]

15歳以上：3粒：3回

8歳以上15歳未満：2粒：3回

5歳以上8歳未満：1粒：3回

5歳未満：服用しないこと前記の量を1日3回毎食後、水又は白湯にて服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

むし歯痛には1粒をむし歯につめてください。

## 用法・用量

1回15才以上3丸，14～8才2丸，7～5才1丸，1日3回食後。

むし歯痛には1丸をむし歯につめる

## 服用間隔（用法:04）

服用間隔4時間以上

## 年齢制限（用法）

5才未満は服用しない

## 用法関連注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 使用上の注意:01

### ■してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなります）

## 使用上の注意:02

1. 本剤を服用している間は，次の医薬品を服用しないこと  
胃腸鎮痛鎮痙薬，ロートエキスを含有する他の胃腸薬，乗物酔い薬
2. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
（目のかすみ，異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）
3. 授乳中の方は本剤を使用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること  
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）

## 使用上の注意:03

### ■相談すること

## 使用上の注意:04

1. 次の人は服用前に医師，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。  
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 心臓病, 緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること [関係部位：症状]

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：食欲不振、胃部不快感

精神神経系：頭痛

泌尿器：排尿困難

その他：顔のほてり、異常なまぶしさ 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 使用上の注意:05

##### ■その他の注意

1. 母乳が出にくくなることもある。
2. むし歯に対しては一時的な鎮痛作用のみで治療の効果はありません。なるべく早く歯科医師の治療を受けてください。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

#### 問い合わせ先

キョクトウ株式会社

お客様相談室 0120-3-18921

午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

TEL (076) 441-2345

製造販売元住所等

キョクトウ株式会社

富山市牛島新町8番10号