

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイル ザメディカル A

眼科用薬

第3類医薬品

乾き^{などに}による^{よる} 疲れを治す

目の酷使などにより涙がとどまりにくくなった瞳は、角膜が傷つき、疲れなどのトラブルを引き起こしやすくなります。

スマイルザメディカル A は、
ビタミンAの2つの働きで、
その原因を根本から改善します。

ビタミンA
最大量配合※1

治すメカニズム

1 角膜を修復

「ヒアルロン酸」を産生し、
角膜の修復を促します。

2 涙をとどめる

涙を安定化させる「ムチン」を
産生し、瞳に涙をとどめます。



方法特許第 5549669 号 ビタミンAの安定化方法
※1 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大量配合

防腐剤
無配合

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を配合していません。

スマイルの独自技術により防腐効果を有しています。

▶ <http://smile.lion.co.jp/pf>

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用后、一時的にかすんでみえる場合がありますので注意してください。

●効能

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル (ビタミンA)	50,000単位	涙を角膜にとどめる「ムチン」を産生し、涙を安定化させるとともに、角膜を修復します。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を目に補給します。

添加物として、ヒプロメロース、ホウ酸、トロメタモール、エデト酸Na、BHT、ポビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、等張化剤、pH調整剤を含む。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (7) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

—お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7