

23パッチ  
大・小2サイズ

マキロン<sup>®</sup>かゆみどめパッチ

第3類医薬品

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないで下さい。  
傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	色素沈着

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

使用期限

製造番号



4 987107 604811

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

虫さされ・かゆみに

マキロンかゆみどめパッチ

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

(成分・分量)本品の膏体100g(1.25m<sup>2</sup>)中

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。(拮ヒスタミン剤)
グリチルルチン酸	0.5g	炎症をおさえます。(消炎剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみをおさえます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物:メタクリル酸・アクリル酸アチルコポリマー、BHT、*l*-メントール  
貼付後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間うちに消失します。

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法】パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。【用法に関連する注意】(1)使用法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)同じ場所に長時間使用しないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】23パッチ  
(直径2.0cm×21パッチ、直径2.5cm×2パッチ)

開封

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
電話 03(5205)8331  
受付時間 9:00～17:00(土、日、休日を除く)

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 救急薬品工業株式会社  
販売元 富山県射水市戸破32-7



登録商標 F