

生薬配合

鎮痛消炎パップ剤

第3類医薬品

新フジパップ® 温感

のびのびピットリ

中袋：開閉チャック付
12枚(6枚入×2袋)

鎮痛消炎薬 第3類医薬品

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

肩こり、腰痛……

生薬(オウバク末)配合

新フジパップ温感 12枚(6枚入×2袋)

新フジパップ温感の特徴

1. 生薬のオウバク末と血液循環をよくする血行促進成分の配合で、心地よい温感刺激があり、肩こりや腰痛等の症状を改善します。
2. 肌への密着性を高めた基剤とのびのび基布によりフィット感にすぐれていますので、関節等の屈伸部位の湿布にも効果的です。
3. 含水タイプの貼りやすく、はがしやすい温感パップ剤です。



肩こり、腰痛に



関節痛に



筋肉痛、筋肉疲労に

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

使 用 法

1日に1～2回表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがして患部に貼付して下さい。

〈使用法に関連する注意〉(1) 使用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。(4) 打撲、捻挫等の急性症状にはハレがひいてから使用して下さい。(5) はがした直後に入浴すると強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがして下さい。(6) 患部が汗でぬれている時は、よくふき取ってから使用して下さい。(7) 衣類に付着すると黄色に着色することがあります。(8) 肌に膏体が残った場合は、お湯などでぬらしてふき取して下さい。

成 分・分 量 膏体100g(850cm²)中

オウバク末……………0.7g ハッカ油……………0.6g
 ユーカリ油……………0.2g dl-カンフル……………0.8g
 ノニル酸ワニルアミド…0.038g

添加物：酸化チタン、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒマシ油、CMC-Na、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、無水ケイ酸、ポリソルベート80、pH調節剤、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na

〈成分・分量に関連する注意〉本品は原料にオウバク末を使用していますので、製品により色調は多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
 電 話 03(5205)8331
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

®登録商標

販売元 **第一三共ヘルスケア株式会社**
 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元 **テイカ製薬株式会社**
 富山市荒川1-3-27



4 987195 584989



開封口