

第3類医薬品

目の疲れ、目のかすみに

特納用

OAリッチ目薬

ピンクの目薬<ビタミンB₁₂配合>

OAリッチ目薬の特徴

パソコン・ワープロ等のOA作業やこまかい仕事、テレビ、勉強、読書等、大切な目はフル稼働しています。

本剤は目の疲れ、目のかすみ、光線による眼炎等に効果を発揮し、いつも健康な目を保たせるためのピンク色の目薬です。

液のピンク色はビタミンB₁₂の色で、ビタミンB₁₂は酷使した目の調節機能改善に関わる成分です。また、角膜の乾燥を防止し、潤いをもたせるコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、目に栄養を与え、はたらきを活発にするビタミンB₆・タウリン、目の炎症やかゆみをやわらげるクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合しています。



目の疲れ



目のかすみ



目のかゆみ

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)

使用法

1回2～3滴、1日5～6回点眼して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (4)点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、赤色の澄明な液で、100m L中に次の成分を含有しています。

クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
タウリン	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化物液50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、ハッカ油、ウイキョウ油

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山市荒川1-3-27