

2011年10月
(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

特納用

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎の症状に

爽AL点鼻薬

爽AL点鼻薬の特徴

花粉やハウスダスト(室内のほこり)等によるアレルギーが増えています。鼻に起こる症状は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ等の不快な症状です。本剤は鼻水、くしゃみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、鼻づまりを緩和するナファゾリン塩酸塩、殺菌作用のあるベンゼトニウム塩化物を配合しています。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

使用法

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1~2度ずつ	1~5回鼻腔内に噴霧して下さい。 (適用間隔は3時間以上おいて下さい)
7歳以上15歳未満		
7 歳 未 満	使用しないで下さい。	

〈使用法に関連する注意〉

- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 点鼻用のみ使用して下さい。

〈容器の使い方〉

- 使用前に正しい使い方に鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまないで下さい)
- 容器のキャップをとり、ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、薬液を1~2度噴霧して下さい。
- 使い初めは、液が噴霧するまで数回空押しして下さい。
- ノズルを鼻腔から外に出してから指の力を抜いて下さい。(鼻腔内で力を抜くと、鼻水等が容器内に吸い込まれ、薬液が汚染される恐れがあります)
- もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返して下さい。
- 使用後は、清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。
- 薬液を噴霧させるため容器は空間を多くとってあります。



成分・分量

本剤は、100m L中に次の成分を含有しています。

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………500mg
 ナファゾリン塩酸塩……………50mg
 ベンゼトニウム塩化物……………20mg
 添加物：等張化剤

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 他の人と共用しないで下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。
 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
 電 話 03(5205)8331
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元
 第一三共ヘルスケア株式会社
 東京都中央区日本橋3-14-10