

鼻づまり・鼻みず・くしゃみの緩和に

第2類医薬品

タイヨ-鼻炎スプレーアルファ

タイヨ-鼻炎スプレーアルファは3つの成分の作用でアレルギー性鼻炎などの鼻づまり、鼻みず、くしゃみなどを緩和します。

ナファゾリン塩酸塩	血管収縮により鼻の通りをよくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	アレルギー症状を緩和します。
ベンザルコニウム塩化物	殺菌作用を示します。

タイヨ-鼻炎スプレーアルファは、逆流しない定量ポンプを採用しているため常に清潔で、一定量の霧状の薬液が鼻腔内の炎症部位に行きわたります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 4) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

（裏面につづきます）

用法・用量

年齢	用法・用量
成人（15才以上）及び7才以上の小児	1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください
7才未満の小児	使用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 点鼻薬は過度に使用すると、かえって鼻づまり、二次充血を招くことがあるので、使いすぎないように注意してください
- 2) 定められた用法・用量を守ってください
- 3) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- 4) 本剤は点鼻用にのみ使用し、目や耳に使用しないでください

■使い方

1. 本剤のご使用前にはよく鼻をかむか、鼻を洗浄してください
2. 薬液が十分に鼻の奥まで到達するように、噴霧後は頭を後ろに傾けてゆっくりと鼻から息をすいこんでください

1. 図のように容器を持ってください。最初にご使用になる時に液が出るまで数回空押しを行ってください。この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし、液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。



2. ノズルを軽く鼻腔内に入れ、フックを下げてください。スプレー時は、容器をかたむけずお使いください。



3. 汚染の原因等になりますので、使用後は、ノズルを清潔なティッシュペーパー等できれいにふいてください。

* ノズルの先端を針等でつつくのは、大変危険ですからおやめください。

成分・分量

本品100mL 中	ナファゾリン塩酸塩	50mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg
	ベンザルコニウム塩化物	20mg
	添加物：グリセリン		

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管してください
- 2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください
- 5) 汚染をさけるため、他の人と共用しないでください
- 6) 使用後はノズルをきれいにふいてください



製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931