

太田漢方胃腸薬Ⅱは、ストレスなどの原因により自律神経が乱れることによって起こる、神経性胃炎や慢性胃炎を改善する胃腸薬で、ストレスの多い現代社会に適しています。  
漢方処方の中散に茯苓を加えることで、効きめを強化しました。胃腸虚弱にもすぐれた効果をあらわします。

**特徴**

- ◎神経性胃炎、慢性胃炎による胃痛、食欲不振によく効きます。
- ◎中散に茯苓を加えた効果的な処方です。
- ◎小粒でのみやすい錠剤です。



**成分** 1日量（9錠）中

安中散加茯苓末	2,100 mg
（下記生薬の混合末）	
ブクリョウ（茯苓）	… 500 mg
ケイヒ（桂皮）	… 300 mg
エンゴサク（延胡索）	… 300 mg
ボレイ（牡蛎）	… 300 mg
ウイキョウ（茴香）	… 200 mg
シュクシャ（縮砂）	… 200 mg
カンゾウ（甘草）	… 200 mg
リョウキョウ（良姜）	… 100 mg

安中散料加茯苓エキス	270 mg
（下記生薬の混合末）	
ブクリョウ（茯苓）	… 810 mg
ケイヒ（桂皮）	… 486 mg
エンゴサク（延胡索）	… 486 mg
ボレイ（牡蛎）	… 486 mg
ウイキョウ（茴香）	… 324 mg
シュクシャ（縮砂）	… 324 mg
カンゾウ（甘草）	… 324 mg
リョウキョウ（良姜）	… 162 mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロタルサイト、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、セルロース

製造販売元	株式会社 太田胃散	
剤型	錠剤	
区分	第2類医薬品	
アイテム	54錠	108錠
希望小売価格(税抜)	980円	1,860円
JANコード	4987033602103	4987033104058
使用期限	3年	

**効能・効果**

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：

**神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱**

**用法・用量**

次の量を食間（就寝前を含む）又は空腹時に服用してください

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	3錠	1日3回
7～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	

**使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 神経性胃炎・慢性胃炎に

# 太田漢方胃腸薬Ⅱ〈錠剤〉第2類医薬品

あんちゆうさん かぶくりょう  
— 安中散加茯苓製剤 —

### 特徴

太田漢方胃腸薬Ⅱ〈錠剤〉は、ストレスなどの原因により自律神経が乱れること  
によって起こる、神経性胃炎や慢性胃炎を改善する胃腸薬で、ストレスの多  
い現代社会に適しております。漢方処方の中散にブクリョウ(茯苓)\*を加  
えることによって、効きめを強化しました。また、胃腸虚弱にもすぐれた効果を  
あらわします。小粒でのみやすい錠剤です。

\*ブクリョウ(茯苓):サルノコシカケ科に属し、主として松の根に発生する菌体です。

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに  
服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談  
してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書  
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに  
胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：

神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

#### 神経性胃炎とは・・・

飲みすぎや食べすぎでもないのに胃の調子がおかしいという時は、ストレス  
による場合が多いようです。ストレスが自律神経の失調をおこし、胃の働き  
が異常となり、胃痛、食欲不振、はきけなどの症状としてあらわれます。  
これを神経性胃炎といいます。

裏面に続きます

### 用法・用量

次の量を食間(就寝前を含む)又は空腹時に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
7～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	

※ 食間とは食後2～3時間のことをいいます。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成 分 1日量(9錠)中

安中散加茯苓末……………2,100mg

安中散料加茯苓エキス………270mg

下記生薬の混合末  
ブクリョウ(茯苓)……………500mg  
ケイヒ(桂皮)……………300mg  
エンゴサク(延胡索)……………300mg  
ボレイ(牡蠣)……………300mg  
ウイキョウ(茴香)……………200mg  
シュクシャ(縮砂)……………200mg  
カンゾウ(甘草)……………200mg  
リョウキョウ(良姜)……………100mg

下記生薬のエキス  
ブクリョウ(茯苓)……………810mg  
ケイヒ(桂皮)……………486mg  
エンゴサク(延胡索)……………486mg  
ボレイ(牡蠣)……………486mg  
ウイキョウ(茴香)……………324mg  
シュクシャ(縮砂)……………324mg  
カンゾウ(甘草)……………324mg  
リョウキョウ(良姜)……………162mg

(添加物)ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロタルサイト、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、セルロース

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 日常生活でのご注意

上手に気分転換をして、  
ストレスの解消を  
心がけましょう。

暴飲・暴食をさけ、  
嗜好品のとり過ぎに  
注意しましょう。

十分な休養をとり、  
規則的な生活を  
心がけましょう。

### 包 装 (錠剤) 54錠・108錠

- ・太田漢方胃腸薬Ⅱ(錠剤)の他に、溶けやすのみやすい散剤タイプの太田漢方胃腸薬Ⅱもあります。
- ・この他、下記の姉妹品があります。目的に合わせてご利用ください。  
飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に太田胃散(缶)、携帯に便利な太田胃散(分包)  
胃のもたれ・食べすぎに小粒でのみやすい太田胃散A(錠剤)

#### 製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」  
☎ (03) 3944-1311 (代表)  
受付時間 9:30～17:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元  
株式会社 太田胃散  
東京都文京区千石2-3-2  
http://www.ohta-isan.co.jp/