

# オムニード0.5IDパップ（テイコクファルマケア株式会社 販売）

（オムニード0.5アイディパップ）

区分	第2類医薬品	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有効成分のインドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎インドメタシンパップ剤です。</li> <li>●粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。</li> <li>●基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱をもった患部を心地よく冷却します。</li> </ul>	
成分／含量	膏体100g(1,000cm <sup>2</sup> )中 インドメタシン 0.5g 添加物として、マクロゴール、トメントール、酸化チタン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有する。	
効能または効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫	
用法／用量	<用法・用量>	
	年齢	使用方法
	15歳以上	ライナー（プラスチックフィルム）をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
	15歳未満	使用しないでください。
	<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守してください。 (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。 (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。 (4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）</li> </ul> 1.次の人は使用しないでください。 (1)本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 [以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性があります。] (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 [ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。] (3)15歳未満の小児。	
	2.次の部位には使用しないでください。	
	(1)目の周囲、粘膜等。	
	(2)湿疹、かぶれ、傷口。	
	(3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。	
	3.連続して2週間以上使用しないでください。	
	●相談すること	
	1.次の人は使用前に、医師又は薬剤師に相談してください。	
	(1)医師の治療を受けている人。	
	(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。	
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。		
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。		
2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師または薬剤師に相談してください。		
(1)使用后、次の症状があらわれた場合		
関係部位	症状	
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血	
(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合		
保管及び取り扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。	
	(2)小児の手の届かない所に保管してください。	
	(3)他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。（誤用の原因となったり品質が変わります。）	
	(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。	
販売会社または取扱会社	テイコクファルマケア株式会社	
お問い合わせ先	帝國製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0879-25-2363 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）	